


*** Приверженность к
лечению у пациентов с
повторным
инфарктом миокарда на
амбулаторном этапе**

Львова А.Б., Репин А.Н.

НИИ кардиологии Томского НИМЦ, г. Томск 2019

* Приверженность к долгосрочной терапии - степень определенного поведения человека - прием лекарств, соблюдение диеты и / или изменение образа жизни, которое соответствует согласованным рекомендациям поставщика медицинских услуг. ВОЗ 2003



* Введение

* Изучение приверженности к лечению на амбулаторном этапе у пациентов с повторным инфарктом миокарда.



* **Цель исследования**

1. Вы когда-нибудь забывали принять препараты? (Да / Нет)

2. Не относитесь ли Вы иногда невнимательно к часам приема препаратов? (Да / Нет)

3. Не пропускаете ли Вы прием препаратов, если чувствуете себя хорошо? (Да / Нет)

4. Если Вы чувствуете себя плохо после приема препаратов, не пропускаете ли Вы следующий прием? (Да / Нет)

4 балла - пациент привержен к терапии

3 балла - недостаточно привержен, с риском перехода в группу неприверженных к лечению.

1-2 балла - не привержен

* Шкала комплаентности Мориски-Грина

Чувствительность 44% Специфичность 47%




* 41 пациент, из них 92,7% - мужчины.

* Средний возраст исследуемых составил $64,8 \pm 10,5$ лет.


* Портрет:
коморбидные
пациенты (СД 2
типа,
ожирение),
вредные
привычки
(курение).

ПОИМ




* Результаты

Результаты



«ДА»



1. Вы когда-нибудь забывали принять препараты?
2. Не относитесь ли Вы иногда невнимательно к часам приема препаратов?


* Около 70% пациентов не смогли назвать принимаемые препараты, тем более их дозировку, так как лечение контролировалось членом семьи (обычно супругой).



- * Более половины пациентов с диагнозом «Повторный инфаркт миокарда» не привержены к лечению на амбулаторном этапе, что могло послужить неблагоприятным фактором к развитию повторного инфаркта.
- * Чаще всего данные пациенты забывают принимать назначенную врачом фармакотерапию или относятся невнимательно к часам приема препаратов.
- * Почти 70% участников исследования затруднились назвать лекарственные препараты, которые они принимали до госпитализации, так как терапия фактически проводилась и контролировалась близкими родственниками.

* **Выводы**

*annlvova@cardio-tomsk.ru



***Спасибо за внимание**